


▶ Pentasa Slow Release Tablet / 펜타사 서방정 500mg

	▶제품명
	펜타사서방정500밀리그램 (메살라진)
	▶원료약품 및 그 분량
	- 1정(750mg) 중 - 유효성분: 메살라진(EP) 500밀리그램 - 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에틸셀룰로오스, 톨크, 포비돈
▶의약품통합정보시스템	
의약품통합정보시스템 바로가기 >	

▶ 효능 및 효과

경증에서 중등도의 궤양성 대장염, 크론병의 치료

▶ 용법 및 용량

이 약은 으깨거나 씹어서 복용할 수 없다. 투여를 용이하게 하기 위해 분할하거나, 투여 직전에 물이나 주스에 현탁시켜 먹을 수 있다.

1. 궤양성 대장염

성인은 급성발병시에는 메살라진으로서 1일 4g까지 1일 1회 또는 2~4회 분할하여 투여하며, 유지요법에는

1일 2g을 1일 1회로 경구투여한다.

만 6세 이상의 소아는 급성발병 시에는 1일 30~50mg/kg을, 유지요법에는 1일 15~30mg/kg을 분할하여 경구 투여한다. 1일 총 복용량이 급성발병 시에는 4g, 유지요법에는 2g을 초과해서는 안 된다.

원칙적으로 40kg을 초과하지 않는 소아의 권장량은 성인의 절반 용량이며 40kg인 소아의 권장량은 일반 복용량에 해당한다.

2. 크론병

성인은 메살라진으로서 1일 4g까지를 분할하여 경구 투여한다.

만 6세 이상의 소아는 급성발병 시에는 1일 30~50mg/kg을, 유지요법에는 1일 15~30mg/kg을

분할하여 경구 투여한다. 원칙적으로 40kg을 초과하지 않는 소아의 권장량은 성인의 절반용량이며 40kg소아의 권장량 성인의 일반 복용량에 해당한다.