

Minirin Melt 60mcg / 미니린멜트(설하정)



제품명

미니린멜트설하정60마이크로그램 (데스모프레신아세트산염)

원료약품 및 그 분량

- 1정(23밀리그램) 중
- 유효성분: 데스모프레신아세트산염(EP) 0.068밀리그램
(데스모프레신으로서 0.060밀리그램)
- 첨가제: 만니톨, 무수구연산, 젤라틴

의약품통합정보시스템

[의약품통합정보시스템 바로가기 >](#)

효능 및 효과

일차성야뇨증(5세 이상), 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨증상의 치료(성인에 한함)

용법 및 용량

1) 일차성 야뇨증 (5세이상)

취침시 데스모프레신으로서 120µg을 설하 투여한다. 효과가 충분하지 않을 경우 240µg까지 증량할 수 있다.

치료기간 중에는 수분섭취를 제한하여야 한다. 수분저류나 저나트륨 혈증의 증후(두통, 구역/구토, 체중증가,

그리고 심한 경우는 경련)가 나타나는 경우에는 환자가 완전히 회복될 때까지 치료를 중단하여야 한다.

이 약으로 치료를 다시 시작하고자 할 때는 엄격하게 수분섭취를 제한하여야 한다. 치료의 지속여부는 투여

3개월 후 적어도 1주일간 투여를 중지한 상태에서 결정한다.

2) 야간다뇨와 관련있는 야간뇨증상의 치료 (성인에 한함)

취침시 데스모프레신으로서 60µg을 설하 투여한다. 일주일 후에도 효과가 충분하지 않을 경우 120µg으로

증량하고, 계속하여 효과가 충분하지 않으면 일주일 간격으로 증량하여 240 μ g까지 사용할 수 있다. 치료기간

중에는 수분섭취를 제한하여야 한다. 용량결정 후 4주 이내에도 임상적인 효과가 없을 경우 투여를 중지한다.