

▶ Minirin Melt 240mcg / 미니린멜트(설하정)



▶ **제품명**

미니린멜트설하정240마이크로그램 (데스모프레신아세트산염)

▶ **원료약품 및 그 분량**

- 1정(23밀리그램) 중
- 유효성분: 데스모프레신아세트산염(EP) 0.272밀리그램
(데스모프레신으로서 0.240밀리그램)
- 첨가제: 만니톨, 시트르산, 젤라틴

▶ **의약품통합정보시스템**

[의약품통합정보시스템 바로가기 >](#)

▶ **효능 및 효과**

일차성야뇨증(5세 이상), 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨증상의 치료(성인에 한함)

▶ **용법 및 용량**

1) 일차성 야뇨증 (5세이상)

취침시 데스모프레신으로서 120 μ g을 설하 투여한다. 효과가 충분하지 않을 경우 240 μ g까지 증량할 수 있다.

치료기간 중에는 수분섭취를 제한하여야 한다. 수분저류나 저나트륨 혈증의 증후(두통, 구역/구토, 체중증가,

그리고 심한 경우는 경련)가 나타나는 경우에는 환자가 완전히 회복될 때까지 치료를 중단하여야 한다.

이 약으로 치료를 다시 시작하고자 할 때는 엄격하게 수분섭취를 제한하여야 한다. 치료의 지속여부는 투여

3개월 후 적어도 1주일간 투여를 중지한 상태에서 결정한다.

2) 야간다뇨와 관련있는 야간뇨증상의 치료 (성인에 한함)

취침시 데스모프레신으로서 60 μ g을 설하 투여한다. 일주일 후에도 효과가 충분하지 않을 경우 120 μ g으로

증량하고, 계속하여 효과가 충분하지 않으면 일주일 간격으로 증량하여 240 μ g까지 사용할 수 있다. 치료기간

중에는 수분섭취를 제한하여야 한다. 용량결정 후 4주 이내에도 임상적인 효과가 없을 경우 투여를 중지한다.