

Minirin Tablet 0.1mg / 미니린 정 0.1밀리그램



제품명

미니린정 0.1밀리그램 (데스모프레신아세트산염)

원료약품 및 그 분량

- 1정(199.61밀리그램) 중
- 유효성분: 데스모프레신아세트산염(EP) 0.1밀리그램
(데스모프레신으로서 0.089밀리그램)
- 첨가제: 감자전분, 스테아르산마그네슘, 유당수화물, 포비돈

의약품통합정보시스템

[의약품통합정보시스템 바로가기 >](#)

효능 및 효과

일차성야뇨증(5세 이상), 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨증상의 치료(성인에 한함)

용법 및 용량

1) 일차성 야뇨증(5세 이상) :

- 취침시 데스모프레신아세트산염으로서 0.2mg을 경구 투여한다.
- 효과가 충분하지 않을 경우 0.4mg까지 증량할 수 있다.
- 치료의 지속여부는 투여 3개월 후 적어도 1주일간 투여를 중지한 상태에서 결정한다.

2) 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨 증상의 치료(성인에 한함) :

- 취침시 데스모프레신아세트산염 0.1mg을 경구 투여한다.
- 일주일 후에도 효과가 충분하지 않을 경우 0.2mg으로 증량하고 계속하여 효과가 충분하지 않으면,
일주일 간격으로 증량하여 0.4mg까지 사용할 수 있다.
- 용량결정 후 4주 이내에도 임상적인 효과가 없을 경우 투여를 중지한다.